



Tabagisme

Prévention

Tabagisme féminin :

- Oestroprogestatifs : AVC, thrombophlébite.
- Fertilité du couple : impuissance, spermatogénèse, allongement des délais, hypofertilité
- Grossesse : avortement, retard de croissance, GEU, prématurité
- Allaitement : accumulation de nicotine dans le lait (comme le liquide amniotique)
- Esthétique : peau, poids, raucité de la voix
- Ménopause précoce, cancer du col

Le tabagisme passif débute dès la petite enfance et peut durer plus de 12h par jour. Outre l'irritation du nez et des yeux, la toux, les sibillants, les nausées et céphalées, 1/3 des cancers du poumon des non-fumeurs et une augmentation de 30% des coronaropathies sont observés chez des non-fumeurs vivants avec un fumeur.

La loi Veil (1976) et la loi Evin (1991), ont pris des dispositions pour protéger la santé des non fumeurs.

Chez les jeunes la moitié d'une classe d'âge autour de 20 ans fume et la moitié de celle-ci risque de mourir d'une maladie liée au tabac. L'impact du marketing et de la publicité développés par l'industrie du tabac en direction de cette population cible est considérable ; ils s'appuient sur des valeurs auxquelles sont sensibles les adolescents (révolte, liberté, séduction...), en les détournant fréquemment.