



Tabagisme

Les risques

Epidémiologie

🕒 Voies respiratoires

- 9 cancers du poumon sur 10 sont dus au tabac.
- Le risque de mourir d'un cancer bronchique peut être multiplié par 56 chez un gros fumeur.
- Le tabac brun (fumée acre et alcaline) donne des épidermoïdes proximaux alors que le tabac blond (fumée acide) donne des adénocarcinomes distaux.
- Le risque de mourir d'une bronchite chronique peut être multiplié par 66 chez un gros fumeur.
- Le risque cancérigène passe de 10 chez le fumeur à 52 en cas d'exposition à l'amiante.
- Après cancer du poumon opéré, l'arrêt du tabac profite plus au gain de survie que la radiothérapie ou la chimiothérapie.
- Cancers ORL.

🕒 Système cardiovasculaire

- Risque d'AVC multiplié par 7 chez les gros fumeurs.
- Risque d'infarctus multiplié par 8 avant 45 ans.
- Potentialisation du risque avec les oestroprogestatifs.
- Anévrisme, artérite, surmortalité.
- Béta-bloquants et aspirine augmentent les chances de survie de moins de 50% : le sevrage est le seul traitement à doubler les chances de survie et à diminuer par 2 les
- Risques de récurrence après infarctus.

🕒 Cancer des voies digestives, du rein, de la vessie, du pancréas, du col de l'utérus