Communiqué de presse

Grenoble, le 6 novembre 2026

Contact presse
Zoé Fertier
Directrice de la communication
04 76 76 53 63 // zfertier@chu-grenoble.fr

Depuis plusieurs années, le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes s'est attaché à poursuivre une politique extrêmement volontariste pour développer son action dans le domaine de la recherche. Les cliniciens participent régulièrement à de grands programmes via des appels à projets nationaux.

Le Programme Hospitalier de Recherche Clinique National (PHRC-N) 2026 a dévoilé ses résultats cet automne, et notre CHU se distingue avec un projet lauréat.

Dr Nicolas SEGOND
Praticien Hospitalier Universitaire, MD, PhD
Urgences - SAMU 38 - CHU Grenoble-Alpes
Laboratoire TIMC - Equipe PRETA - Univ. Grenoble-Alpes



FIRST DEFI

Anterior-posterior pad placement as the first strategy for defibrillation in out-of-hospital cardiac arrest.

Lors d'un arrêt cardiaque extrahospitalier avec rythme choquable, la position initiale des électrodes de défibrillation reste encore débattue. Des données observationnelles récentes suggèrent qu'une position antéro-postérieure (AP) serait associée à davantage de retours à une circulation spontanée comparée à la position antéro-latérale (AL), actuellement réalisée. L'objectif de ce projet sera de déterminer si la position AP, utilisée en première intention, améliore la survie des patients.

Pour y répondre, le Dr Nicolas Segond est lauréat d'un financement au PHRC-N 2026 qui permettra la mise en place d'un essai multicentrique, prospectif, randomisé en clusters dans 24 centres en France. Chaque centre (correspondant à un centre hospitalier associé à service département d'incendie et de secours) appliquera une seule stratégie, AL ou AP, pendant toute la durée de l'étude. Le critère de jugement principal sera la survie à 30 jours avec un bon pronostic neurologique.

Il s'agira du premier essai clinique de grande ampleur comparant ces deux stratégies.

Cette intervention simple, réalisée dès les premières minutes de la prise en charge, pourrait améliorer le devenir des patients après un arrêt cardiaque.