

## Addictovigilance

### Les addictions et le COVID19

Dès le 27 mars dernier, les centres régionaux de vigilance ont été sollicités par l'ANSM, pour travailler en étroite collaboration dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Dans le cadre de l'addictovigilance, en raison d'une possible augmentation de la consommation et du mésusage de certains médicaments psychoactifs du fait du contexte social et du fait d'un assouplissement des conditions de prescription et délivrance de certaines spécialités psychoactives par les pharmacies de ville, les CEIP-A ont assuré un suivi rapproché de tout cas clinique avéré d'overdose, avec ou sans décès, liée à la consommation de :

- Méthadone,
- Opiïdes forts utilisés dans la douleur (morphine, fentanyl transmuqueux, fentanyl transdermique et oxycodone).

En lien avec le contexte COVID19 et ses conséquences sur la vie sociale, a également été réalisée une surveillance accrue :

- des cas d'overdoses liés aux substances illicites hors médicaments,
- des modifications de consommation de médicaments psychotropes

Le centre d'addictovigilance de Grenoble, en charge des enquêtes DRAMES et DTA, et celui de Marseille, en charge du suivi national d'addictovigilance pour la méthadone, ont été nommés référents de cette surveillance renforcée.

En pratique, la réception des signalements par les centres d'addictovigilance référents était réalisée de manière bihebdomadaire avec une restitution plénière hebdomadaire.

Précocement, des éléments préoccupants ont été détectés vis-à-vis de l'usage de la méthadone.

Dans un communiqué du 14 avril (1), le réseau national des centres d'addictovigilance a tenu à rappeler, non seulement la nécessité de faciliter l'accès à la méthadone, mais aussi de maintenir la sécurité de son usage, afin de prévenir la survenue de surdosages, d'arythmies cardiaques et de décès.

Une plaquette d'information a été diffusée afin de promouvoir auprès des usagers l'accès et l'administration de l'antidote de la méthadone, la naloxone, en cas de signes de surdosage (2).

Courant mai, ces documents ont été complétés par une plaquette informative sur la méthadone, ses risques et sur la réduction des risques, à destination des patients (3).

Le suivi renforcé s'est poursuivi jusqu'au 30 juin. Les différents rapports issus de ce suivi renforcé intégrant l'évaluation et la synthèse des signalements marquants en période COVID sont consultables sur le site de l'ANSM : [https://www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Systemes-de-vigilances-de-l-Agence/COVID-19-Dispositif-renforce-de-Pharmacovigilance-et-d-Addictovigilance/\(offset\)/0](https://www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Systemes-de-vigilances-de-l-Agence/COVID-19-Dispositif-renforce-de-Pharmacovigilance-et-d-Addictovigilance/(offset)/0)

Dr Nathalie Fouilhé Sam-Lai, Centre d'Evaluation et d'information sur la Pharmacodépendance - Addictovigilance

(1)[http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/communique\\_association\\_addictovigilance\\_met\\_hadone\\_14\\_avril\\_2020.pdf](http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/communique_association_addictovigilance_met_hadone_14_avril_2020.pdf)

(2)[http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/plaquette\\_information\\_addictovigilance\\_naloxone.pdf](http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/plaquette_information_addictovigilance_naloxone.pdf).

(3)[http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/plaquette\\_addictovigilance\\_sur\\_la\\_methadone\\_patient\\_vf.pdf](http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/plaquette_addictovigilance_sur_la_methadone_patient_vf.pdf)